

প্রাণিসম্পদ সেবায় ইয়ান



রুমিনেন্ট প্রোডাক্টস্

ব্লট/টিম্পেনি/পেট ফাঁপারোধী



সরবরাহ: ১০০ মিলি

Bloat Zero® Suspension

For relief from Bloat

উপাদান:
সিমেথিকোন ১%
ডিলওয়েল ০.৫%

নির্দেশনা:
সকল প্রকার ব্লট ও টিম্পেনি অথবা মারাত্মক ব্লট
যখন প্রকাশ পায় তখন ব্যবহার্য।

ব্লট জিরো® সাসপেনশন

প্রয়োগমাত্রা:
গরু ও মহিষ: দৈনিক ১০০ মিলি করে খাওয়াতে হবে
ছাগল ও ভেড়া: দৈনিক ২০ মিলি করে খাওয়াতে হবে

ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট



সরবরাহ: ৫০০ মিলি
১ লি., ৫ লি. ও ২০ লি.

MegaPhos® Suspension

Build Strong Bone & Increase Productivity

উপাদান: প্রতি ২০ মিলিতে আছে-
ফসফরাস - ২০০ মিগ্রা
ক্যালসিয়াম - ৪০০ মিগ্রা
ভিটামিন বি_{১২} - ২০ মিগ্রা
ভিটামিন ডি_৩ - ১৬০০ আই ইউ

নির্দেশনা:
ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগসমূহের
চিকিৎসা ও প্রতিরোধ করে; দৈনিক ওজন এবং দুধ উৎপাদন
বৃদ্ধি করে; দুগ্ধজ্বর দূর করে ও রক্তশূন্যতা হ্রাস করে।

মেগাফস® সাসপেনশন

প্রয়োগমাত্রা:
গবাদিপ্রাণি: দৈনিক ১০০ মিলি করে ৭-১০ দিন
খাওয়াতে হবে
বাহুর, ছাগল ও ভেড়া: ২০-২৫ মিলি করে দিনে দুই বার
খাওয়াতে হবে

হজমশক্তি বৃদ্ধিকারক (Digestive Stimulant)



সরবরাহ: প্রতি বাক্সে
২০ গ্রাম X ১০ স্যাচেট

Digifast® Powder

বদহজম প্রতিরোধ ও খাবারের হজম বৃদ্ধিকারক হিসেবে কাজ করে

উপাদান: প্রতি ২০ গ্রাম পাউডারে আছে-
অ্যামোনিয়াম বাইকার্বোনেট - ৫ গ্রাম, সোডিয়াম
বাইকার্বোনেট - ১৩ গ্রাম, নাক্সভোমিকা - ১.৪
গ্রাম, জেনসিয়ান পাউডার - ৩০০ মিগ্রা ও
জিনজার পাউডার - ৩০০ মিগ্রা

নির্দেশনা:
গবাদিপ্রাণির বদহজম, পেটফাঁপা,
পাকস্থলী প্রদাহ, খাদ্যে অরুচি ও
ক্ষুধামন্দায় ব্যবহার্য।

প্রয়োগমাত্রা:
গরু ও মহিষ:
১০০-৩০০ কেজি: ১-২ টি স্যাচেট দিনে ২ বার খাওয়াতে হবে
৩০০-৫০০ কেজি: ৩ টি স্যাচেট দিনে ২ বার খাওয়াতে হবে
বাহুর, ছাগল ও ভেড়া: ১৫-২৫ কেজি ওজনের জন্য ১/৪- ১/২টি
স্যাচেট দিনে ২ বার খাওয়াতে হবে

ডিজিফাস্ট® পাউডার

লিভারটনিক



সরবরাহ: ৫০০ মিলি, ১ লি.

Livaton® liquid

রুচি বৃদ্ধিকারক খাদ্য হজমে সহায়ক

উপাদান:
হার্বাল লিভার টনিক

নির্দেশনা:
লিভারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে; ফ্যাটি লিভার
সিনড্রোম প্রতিকার করে; লিভার ফাইব্রোসিস
প্রতিরোধ করে এবং টক্সিনের ক্ষতি থেকে
লিভারকে রক্ষা করে।

লিভাটন® লিকুইড

প্রয়োগমাত্রা:
পোষ্ট্রি: ১ মিলি/ লি. পানিতে
বাহুর, ছাগল ও ভেড়া: দৈনিক ১৫-৩০ মিলি।
(প্রতি মাসে ৭-১০ দিন খাওয়াতে হবে)।
গবাদিপ্রাণি: দৈনিক ৩০-৬০ মিলি (প্রতি মাসে
৭-১০ দিন খাওয়াতে হবে)।

কাফ (বাছুর) হেলথ ম্যানেজমেন্ট প্রোডাক্টস্



সরবরাহ: ১ কেজি,
২.৫ কেজি, ১০ কেজি

Eurolac Green Powder

Powder

Save Milk, Save Calf

উপাদান:

প্রোটিন-২০%, চর্বি-১৬%,
মিনারেল-১০.৫%, ড্রুড ফাইবার-০.০২%,
ভিটামিন এ-২৫০০০ আই ইউ, ভিটামিন
ডি - ৫০০০ আই ইউ, ভিটামিন সি- ১০০
মি: গ্রাম:, ভিটামিন ই- ১০০ মি: গ্রাম:,
এছাড়া বিভিন্ন ম্যাক্রো ও মাইক্রো মিনারেল
রয়েছে।

নির্দেশনা:

ইউরোলাক গ্রিন হল একটি কাফ মিক্স রিপ্রেসার
যা বাছুরের প্রাথমিক জীবনের (১০-১২ সপ্তাহ
বয়স পর্যন্ত) খাবার হিসেবে তার দেহের পুষ্টির
চাহিদা পূরণ করে। ইহা একটি আদর্শ টপ
কোয়ালিটি ফিড যা বাছুরকে সুস্থ সবল রাখে;
ভালমানের দুধাল গাভীর উপযোগী বকনা বা ঝাঁড়
গরু তৈরী করে; খামারীকে ভেটেরিনারী প্রোডাক্ট
(ঔষধ) ব্যবহারে অর্থনৈতিকভাবে সশ্রমী করে।

ইউরোলাক গ্রিন পাউডার

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

১৬০/১২০ গ্রাম ইউরোলাক গ্রিন ১ লিটার ফুটানো
বিশুদ্ধ পানিতে কুসুম গরম (৪৩-৪৫° সে. বা
১১০-১১৫° ফা.) অবস্থায় অথবা ১ কেজি ইউরোলাক
গ্রিন ৭ লিটার কুসুম গরম (৪৩-৪৫° সে. বা
১১০-১১৫° ফা.) পানিতে মিশিয়ে, প্রস্তুতকৃত CMR
গরম (৩৭-৪০° সে. বা ১০০-১০৫° ফা.) অবস্থায়
বালতি অথবা ফিডার (Bucket/Calf Feeder) এর
মাধ্যমে দিনে ২-৩ বার খাওয়াতে হবে।



সরবরাহ: ১০০ গ্রাম

AS-Vital Powder

Fast Support In case of Diarrhoea

উপাদান:

এন্টারোকক্কাস ফেসিয়াম স্পোর ৬.৩ X ১০^৯ সি.এফ.ইউ, ডেফ্রোজ, প্যানট্যাগো সিড, কর্ণ
স্টার্চ, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাই কার্বোনেট, ফ্লুক্সোজ, ব্রেণ্ডারস ইন্ট, ডাই
পটাসিয়াম ফসফেট, হোয়ে পাউডার, গুয়ার মিল, ল্যাক্টোজ, বাটার মিক্স পাউডার, সয়াপ্রোটিন
কনসেন্ট্রেট, কোকোস তেল, পাম তেল, ম্যাগনেসিয়াম সল্ট অব ফিউমারেট, গম,
মনোপটাসিয়াম ফসফেট।

এজ-ভাইটাল পাউডার

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

ডায়রিয়া চিকিৎসা: লক্ষণ প্রকাশের সাথে সাথে বাছুর
প্রতি ৩০-৫০ গ্রাম/ লি. কুসুম গরম পানিতে মিশিয়ে
দিনে ২-৩ বার পরপর ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
ডায়রিয়া প্রতিরোধে: প্রতিদিন ২৫ গ্রাম করে কাফ মিক্স
রিপ্রেসার এর সাথে ৭ দিন খাওয়াতে হবে।

এন্টিহিস্টামিন/এলার্জিরোধী (Antiallergic) প্রোডাক্ট



সরবরাহ:
১০ মিলি, ১০০ মিলি

PhenaVet® Injection

উপাদান:

ফেনিরামিন মেলিটেট ২২.৭৫ মিগ্রা/ মিলি

নির্দেশনা:

গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগের কারণে সৃষ্ট- হিস্টামিনের প্রভাবে
শরীরের বিভিন্ন স্থানে চুলকানি, এলার্জি, চর্মরোগ, গিরাফেলা,
পেটফাঁপা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রদাহের জন্য ডামটিইটিস,
সর্দি, কাশি ও রাইনাইটিস ইত্যাদি রোগে ব্যবহার্য।

ফেনা ভেট® ইনজেকশন

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:

গরু ও মহিষ: ১ মিলি/ ১০ কেজি দৈহিক
ওজন হিসাবে মাংসপেশীতে ব্যবহার্য।
ছাগল ও ভেড়া: ১-২ মিলি/ ১০ কেজি
দৈহিক ওজন হিসাবে মাংসপেশীতে
ব্যবহার্য।

ওলান/ আডার হেলথ ম্যানেজমেন্ট প্রোডাক্ট



সরবরাহ: ৬০ গ্রাম

UDDER CHECK Powder

Outstanding Performance in Subclinical and Clinical Mastitis

উপাদান:

ল্যাকটোব্যাসিলাস স্পোর ৬.৩ X ১০^৯ সি.এফ.ইউ,
ভিটামিন (এ, ডি, ই, নিয়াসিন, বায়োটিন,
রিবোফ্লাবিন), প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট, কপার
সালফেট, অ্যামাইনো নাইট্রোজেন

নির্দেশনা:

গবাদিপ্রাণির ওলান প্রদাহ (সাবক্লিনিক্যাল ও
ক্লিনিক্যাল ম্যাসটাইটিস) প্রতিরোধে ব্যবহার্য।

আডার চেক পাউডার

প্রয়োগমাত্রা:

প্রতি গাভীর জন্য দিনে ৬০ গ্রাম পাউডার পর
পর ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে

ভিটামিন ও মিনারেল



সরবরাহ:
৩০ মিলি, ১০০ মিলি

E-SolVet® Injection

বিপাকীয় উদ্দীপক ও দ্রুত দৈহিক ওজন বৃদ্ধিকারক

উপাদান:

প্রতি ১০ মিলিতে আছে-
বিউটাফসফেন - ১০০০ মিগ্রা ও
সায়ানোকোবালমিন - ০.৫ মিগ্রা

নির্দেশনা:

মোটাজাকরণ, প্রজনন ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত
প্রাণির মাংসপেশীর কর্মদক্ষতা বাড়াতে ব্যবহার্য; অপুষ্টি,
দুর্বলতা, সেকেন্ডারি অ্যানিমিয়া, ক্লান্তি, ঠান্ডা, কাঁপুনি
ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

ই-সলভেট® ইনজেকশন

প্রয়োগমাত্রা:

গরু ও মহিষ: ৫-২৫ মিলি করে মাংসে দিবেন।
বাছুর: ৫-১২ মিলি করে মাংসে দিবেন।
ছাগল ও ভেড়া: ২.৫-৫ মিলি করে মাংসে দিবেন।
ভেড়া ও ছাগল ছানা: ১.৫-২.৫ মিলি করে মাংসে দিবেন।
পোন্ডি: ১ মিলি/ ১-২ লি. পানিতে ৩-৫ দিন।



সরবরাহ: ১০০ মিলি,
৫০০ মিলি, ১ লি. ও ৫ লি.

OraZinc® Solution

ওরাজিংক® সলিউশন

গবাদিপ্রাণির এনজাইম সিস্টেমকে কার্যকর করার মাধ্যমে রুচিবোধ বাড়ায়, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম এ সহায়তা করে এবং চামড়ার রোগ প্রতিরোধসহ দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

উপাদান: প্রতি ৫ মিলিতে
জিংক-১০ মিগ্রা (জিংক
সালফেট মনোহাইড্রেট
হিসেবে)

নির্দেশনা:
খাবার গ্রহণের পরিমাণ বাড়ায়; রোগ প্রতিরোধ
ক্ষমতা, দৈহিক ওজন, লোমের উজ্জলতা এবং
রুচি বৃদ্ধি করে ও হাঁড়ের গঠনে সাহায্য করে।

প্রয়োগমাত্রা:

গবাদিপ্রাণি: ১০০-২০০ কেজি ওজনের জন্য দৈনিক ১০০-২০০ মিলি করে খাওয়াতে হবে।
বাহুর, ছাগল ও ভেড়া: ৪০-৫০ কেজি ওজনের জন্য দৈনিক ৪০-৫০ মিলি করে
খাওয়াতে হবে।

পোন্ধি: প্রতিরোধে: ২ মিলি/ ১ লি. পানিতে।

চিকিৎসায়: ৩ মিলি/ ১ লি. পানিতে



সরবরাহ:
১ কেজি, ২৫ কেজি

VitaX-DB Gold
Powder

ভিটাএক্স®-ডিবি গোল্ড
পাউডার

To improve milk & meat production and reproductive performance

উপাদান:
মাল্টিভিটামিন এবং
মাল্টিমিনারেল প্রিমিক্স

নির্দেশনা:
দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করে; গাভীকে সতেজ ও প্রজনন ক্ষমতা
ত্বরান্বিত করে; দ্রুত বেড়ে উঠা নিশ্চিত করে; শারীরিক দুর্বলতা
রোধ করে; কৃমিনাশক প্রয়োগজনিত গাঁড়ন রোধ করে।

প্রয়োগমাত্রা:

গরু ও মহিষ: দৈনিক ১০-২০ গ্রাম করে খাওয়াতে হবে।

ছাগল ও ভেড়া: দৈনিক ৫-১০ গ্রাম করে খাওয়াতে হবে।

বাহুর: দৈনিক ৫-১০ গ্রাম অথবা ১ গ্রাম/ কেজি খাদ্যে।

কৃমিনাশক/এনথেলমিনাটিক



সরবরাহ:
প্রতি বাক্সে ১০ X ২ টি বোলাস

Levaben® Bolus

লিভাবেন® বোলাস

বহুমুখী কার্যক্ষমতা সম্পন্ন কৃমিনাশক

উপাদান: প্রতি বোলাসে আছে-
লিভামিসল বিপি ৬০০ মিগ্রা ও
ট্রাইক্লোবেনডাজল আইএনএন ৯০০ মিগ্রা

নির্দেশনা: কলিজাকৃমি মড়ক সৃষ্ট তীব্র; অতি তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদী ফ্যাসিওলিয়েসিস
এ আক্রান্ত গবাদিপ্রাণির চিকিৎসায় ব্যবহার্য; পাকস্থলী ও অন্ত্রনালীর এবং ফুসফুসের
প্রধান গোল কৃমিকে লিভাবেন বোলাস কর্তৃক সমূলে ধ্বংস করে।

প্রয়োগমাত্রা: ১ টি বোলাস
প্রতি ৪০-৭৫ কেজি দৈহিক
ওজনের জন্য।

হরমোনাল/রিপ্রোডাক্টিভ প্রোডাক্ট



সরবরাহ:
১০০০ আই.ইউ +
২ মিলি সলভেন্ট

SERGON Injection

হিট ইনডিওসার (Heat Inducer)

সারগন ইনজেকশন

A weapon to solve the anoestrous problem

উপাদান: প্রতি মিলি মিশ্রণে-
গোনাডোট্রপিন হরমোন
(PMSC)- ৫০০ আই.ইউ

নির্দেশনা: এনইস্ট্রাস (গাভী গরম না
হওয়া), ইস্ট্রাস ইনডাকশন, ইস্ট্রাস
সিনক্রোনাইজেশন এবং ওভারীর কর্মক্ষমতা
বৃদ্ধি করে গাভীর ফার্টিলিটি বৃদ্ধির চিকিৎসায়
ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগমাত্রা:

গাভী: ২০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০০০-৩০০০ আইইউ।

২০০-৪০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ২০০০ আইইউ, মাংসে দিবেন।

ছাগল ও ভেড়া: ৫০০ আইইউ মাংসে দিবেন।

কুকুর: ২৫০-৫০০ আইইউ মাংসে দিবেন।

খরগোশ: ২৫-৫০ আইইউ মাংসে দিবেন।



সরবরাহ:
প্রতি বাক্সে ৫ X ৪ বোলাস

Fertisol Vet

Unique combination of Trace Minerals, Vitamins & Prebiotic

উপাদান:
ট্রেস মিনারেলস্,
ভিটামিনস্ ও প্রিবিয়োটিক

নির্দেশনা:
ফার্টিসল ভেট গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন মিনারেল ঘাটতি জনিত সমস্যার
পাশাপাশি প্রজনন তন্ত্রের সমস্যা ও বাচ্চা প্রসবকালীন সময়ে গাভীর
বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
রিপট ব্রিডিং সিনড্রোম এর ঝুঁকি কমায়। এনোস্ট্রাস, সাইলেন্ট হিট
প্রতিরোধ করে।

প্রয়োগমাত্রা:

গরু, মহিষ: ১-২ টি বোলাস পর পর ১০ দিন খাওয়াতে
হবে।

ছাগল, ভেড়া: ১/২-১ টি বোলাস পর পর ১০ দিন
খাওয়াতে হবে।

প্রসূতি গাভীর হেলথ ম্যানেজমেন্ট প্রোডাক্ট



সরবরাহ: ১ কেজি

AC Quick Fit Powder

প্রসব পরবর্তী গাভীর জন্য অত্যাবশ্যকীয় এনার্জি সাপ্লিমেন্ট

উপাদান:

ডেক্সট্রোজ, হোয়ে পাউডার, ভিটামিন এ- ২,০০,০০০
আই.ইউ./কেজি, ভিটামিন ডি- ২০,০০০ আই.ইউ./কেজি,
ভিটামিন ই- ১,০০০ মি.গ্রা./কেজি, সোডিয়াম ক্লোরাইড,
সোডিয়াম বাই কার্বোনেট, ভেজিটেবল ওয়েল

নির্দেশনা:

দ্রুত শক্তি অর্জনে সহায়তা করে; দ্রুত অমরা বের হতে
সহায়তা করে গাভীকে সতেজ, সুস্থ ও শক্তিশালী রাখতে
সহায়তা করে।

প্রয়োগমাত্রা:

প্রসবের পর সরাসরি ১ কেজি
পাউডার ২০ লি. কুসুম গরম
পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে
হবে।

এসি কুইক ফিট পাউডার

বায়োসিকিউরিটি প্রোডাক্ট



সরবরাহ: ২০ গ্রাম

TIMSENTM Granular

বহুমুখী কার্যকারিতা সম্পন্ন ১০০% বায়োডিগ্রেডেবল আদর্শ জীবাণুনাশক

উপাদান:

এন-অ্যালকাইল ডাই-মিথাইল
বেনজাইল অ্যামোনিয়াম
ক্লোরাইড - ৪০%,
ইউরিয়া - ৬০%

প্রয়োগমাত্রা:

নিয়মিত ফার্ম স্প্রে (ফ্লোর; খাবার পাত্র/ ম্যানজার)- ১ গ্রাম/ ১ লিটার পানিতে।
ফুট বাথ- ২ গ্রাম/ ১ লিটার পানিতে
টিট ডিপিং (ম্যাসটাইটিস প্রতিরোধে)- ১ গ্রাম/ ২ লিটার পানিতে (দুধ দোহনের আগে ও পরে)।
পায়ের ক্ষুর ও প্রাণির শরীরে স্প্রে (ক্ষুররোগ প্রতিরোধে)- ১ গ্রাম/ ১ লিটার পানিতে
পিপিআর প্রতিরোধে- ১ গ্রাম/ ১ লিটার পানিতে।

টিমসেনTM রুমিনেন্ট
দানাদার

ফিড এডিটিভ্‌স



সরবরাহ:
১ কেজি, ২৫ কেজি

RumiBoost Powder

অধিক শক্তি, অধিক দুধ ও মাংস বৃদ্ধিতে

উপাদান:

বাহকবিহীন ১০০% উজ্জ্বল ফ্যাট পাউডার।

নির্দেশনা:

গবাদিপ্রাণির দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দুধের
ফ্যাট এর প্রোটিন লেভেল একটি নির্দিষ্ট মাত্রায়
রাখে, গবাদিপ্রাণির দৈহিক ওজন বৃদ্ধি করতে
সহায়তা করে, গবাদিপ্রাণির কিটোসিস ও ফ্যাটি
লিভার প্রতিরোধ করে, গবাদিপ্রাণির প্রজনন
ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যাঁড় গরুর মাংসের
গুনাগুণ অক্ষুণ্ণ রাখে, কৃমির ঔষধ খাওয়ানোর পর
স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, সম্পূর্ণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত।

রুম্বিস্ট পাউডার

প্রয়োগমাত্রা:

গাভী: ৫০-১০০ গ্রাম (উন্নত জাতের জন্য)
২০-৩০ গ্রাম (দেশী জাতের জন্য)
বিফ ক্যাটেল: ৫০-১০০ গ্রাম (প্রতিদিন
খাদ্যের সাথে)
ছাগল ও ভেড়া: ১০-২০ গ্রাম (প্রতিদিন
খাদ্যের সাথে)

পোল্ট্রি প্রোডাক্টস্

বায়োসিকিউরিটি প্রোডাক্টস্



সরবরাহ: ২০ গ্রাম
৫০ গ্রাম ও ১ কেজি

TIMSEN Granular

বহুমুখী কার্যকারিতা সম্পন্ন ১০০% বায়োডিগ্রেডেবল আদর্শ জীবাণুনাশক

বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা:

টিমসেন মাত্র ৩০ সেকেন্ডে ৯৯.৯৯% জীবাণু নির্মূল করে; জীবাণুর প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় না ফলে সবসময় ব্যবহার করা যায়; নন-করোসিভ ও নন কার্সিনোজেনিক, ১০০% বায়োডিগ্রেডেবল (Bio-degradable) ফলে ইহা প্রাণি ও প্রকৃতির জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং কোনো প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই; পানিতে ব্যবহৃত ভিটামিন ও অন্যান্য ঔষধের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে; পানির পায়ে ও পাইপে স্ট্র (Bio-film) ধ্বংস করে ফলে জীবাণু বংশ বৃদ্ধি করতে পারে না; এসিড ও ক্ষার উভয় মাধ্যমে ৩-11 pH-এ কাজ করে; পানির খরতা দূর করে; নিম্ন ও উচ্চ তাপমাত্রা (৪-৮০° সে.) উভয় অবস্থায় কাজ করে; বিভিন্ন রোগে ঔষধের সাথে টিমসেন পানিতে ব্যবহার করলে রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়।

টিমসেন পোল্ট্রি দানাদার

প্রয়োগমাত্রা:

স্প্রে: ১ গ্রাম/ লিটার পানিতে
খাবার পানিতে: ১ গ্রাম/ ১৬ লিটার
ফুটবাথ: ২ গ্রাম/ লিটার পানিতে
উপাদান:
এন-অ্যালকাইল ডাই-মিথাইল
বেনজাইল অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড -
৪০%, স্ট্যবিলাইজড ইউরিয়া ৬০%



সরবরাহ: ১০০ মিলি

Bio-Ade[®] Super

ইউকা সিডিজেরা গাছের নির্যাস

ক্ষতিকর অ্যামোনিয়া গ্যাস মুক্ত খামারের নিশ্চয়তা

বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা:

বায়ো-এড খামারে ক্ষতিকর গ্যাসকে (অ্যামোনিয়া) নিয়ন্ত্রণ করে; মাইকোপ্লাজমা, করাইজা, গামবোরো, রাণীক্ষেত, এসাইটিস ও অন্ধত্ব রোগ প্রতিরোধ করে; নিয়মিত ব্যবহারে খামারে রোগ প্রতিরোধ করে খামারকে লাভজনক হতে সহায়তা করে; চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করে এবং পরিবেশ উন্নত করে; মৃত্যুর হার হ্রাস করে।

বায়ো-এড[®] সুপার

প্রয়োগমাত্রা:

১ মিলি/ ২০-২৫ লিটার
পানিতে খাওয়াতে হবে
স্প্রে: ১০ মিলি/ লিটার
পানিতে



সরবরাহ: ১০০ মিলি
৫০০ মিলি ও ১ লি.

EcoSal[®]-pH

1st Choice to Prevent
Salmonella & E.coli

বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা:

ইকোসাল-পিএইচ খাবার পানি ও মুরগির খাদ্যনালীতে অবস্থিত ক্ষতিকর এন্টারোব্যাকটেরিয়া যেমন- সালমোনেলা, ই কলাই ধ্বংস করে পোল্ট্রিকে সুস্থ রাখে; বাচ্চা মুরগির নাজী কাঁচা রোগ (Omphalitis) নিরাময়ে ভূমিকা রাখে; ইকোসাল-পিএইচ ব্যবহারে পানির পি এইচ মান হ্রাস পেয়ে ৪ হয় যাতে সালমোনেলা, ই.কলাই বাঁচতে পারেনা; ইকোসাল-পিএইচ মিশ্রিত পানি পোল্ট্রিকে খাওয়ালে পাকস্থলীর পি এইচ কমে যায় ফলে পেপসিনোজেন পেপসিনে রূপান্তরিত হয়; এই পেপসিন প্রোটিন জাতীয় খাবারকে হজমে সহায়তা করে; পোল্ট্রির ডায়রিয়া দ্রুত নিরাময়ে সাহায্য করে; নিয়মিত ব্যবহারে খামারে সালমোনেলা; ই.কলাই এর আক্রমণ প্রতিরোধ করে; ইকোসাল-পিএইচ ব্যবহারে এয়ার স্যাকুলাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস, পেরিহেপাটাইটিস প্রতিরোধ সম্ভব হয়; পোল্ট্রির লিটার ভেজা সমস্যা সমাধান করে; ক্ষুধামন্দা বা অরুচি দ্রুত দূর করে।

ইকোসাল[®]-পিএইচ

প্রয়োগমাত্রা:

প্রতিরোধে: ১ মিলি/ লিটার
পানিতে খাওয়াতে হবে
চিকিৎসায়: ২ মিলি/ লিটার
পানিতে খাওয়াতে হবে



সরবরাহ:
৫০০ গ্রাম ও ২৫ কেজি

betafin[®]

প্রাকৃতিক বিটেইন

ধকলবিহীন প্রতিদিন

বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা:

বিটাফিন জীবন্ত কোষের মধ্যে পানি ও আয়নের ভারসাম্য রক্ষা করে; মিথিওনিন ও কোলিন এর চেয়ে প্রায় ৪ গুন মিথাইল ডোনার; যেকোনো প্রকার ধকলজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে; পোল্ট্রির হিট ষ্ট্রোক প্রতিরোধ করে; মৃত্যুর হার হ্রাস করে; ঔষধের সাথে ব্যবহারে দ্রুত কল্লিডিওসিস নিরাময়ে সহায়তা করে; প্রাকৃতিক খাদ্য উপাদান বিধায় এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই; শরীরের কোষগুলোকে সজীব ও কর্মক্ষম রাখে; ব্রয়লারের বুকের মাংস বৃদ্ধি করে; গরমে হাঁপানিজনিত (Panting) ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।

বিটাফিন[®]

প্রয়োগমাত্রা:

পানিতে: ২৫০ গ্রাম-১ কেজি/ ১০০০
লিটার পানিতে খাওয়াতে হবে
খাদ্যে: ২৫০ গ্রাম- ১ কেজি/ টন খাদ্যে
অতিরিক্ত ধকল: ১ কেজি/ টন অথবা ১০০০
লিটার পানিতে
উপাদান:
এনহাইড্রাস বিটেইন ৯৭%

ROMA

ইদুরের বংশ রোমা করে ধ্বংস

রোমা



সরবরাহ: ১০০ গ্রাম

উপাদান:
ব্রোমোডিয়লিন

ইদুরের কারণে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ:
সালমোনেলা, ই.কলাই ও প্রেগ রোগ সৃষ্টি করে; গুদাম ঘরে রক্ষিত
(যেমন খাবারের বস্তা ছিদ্র করে) খাবারের খাদ্যমান নষ্ট করে;
উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং খামারীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রয়োগমাত্রা:
ইদুর চলাচলের রাস্তা বা এর আবাসস্থল (গর্তের
মুখে) প্রতিদিন ২ টুকরা (৩৩ গ্রাম) পরপর
নূন্যতম ৩-৫ দিন।

ভিটামিন ও মিনারেল

VitaX[®]-B₁B₂ ^{plus} Powder

ভিটএক্স[®]-বি_১বি_২ ^{প্লাস} পাউডার

Active Nerve Makes Strong & Healthy Livestock



সরবরাহ: ১০০ গ্রাম

উপাদান: প্রতি ১০০ গ্রাম পাউডারে-
ভিটামিন বি_১ - ৫০০০ মিগ্রা
ভিটামিন বি_২ - ১০০ মিগ্রা
প্রাকৃতিক বিটেইন

নির্দেশনা:
প্যারালাইসিস, চর্মপ্রদাহ, টোট ও নখ বেঁকে
যাওয়া, স্নায়বিক বৈকল্য (ঘাড় বেঁকে
যাওয়া) ইত্যাদি দূর করে ও প্রাকৃতিক
বিটেইন যা সৃষ্ট পীড়ন/ধকল রোধ করে।

প্রয়োগমাত্রা:
প্রতিরোধে: ১ গ্রাম/ ২ লি. পানিতে ৩-৫ দিন
চিকিৎসায়: ১ গ্রাম/ লি. পানিতে ৩-৫ দিন অথবা ১০ গ্রাম পাউডার
৪-৫ কেজি খাদ্যের মিশিয়ে ৩-৫ দিন
গবাদিপ্রাণি: ৫ গ্রাম পাউডার ২.৫ কেজি খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ৩-৫ দিন

VitaX[®]-WS ^{plus} Powder

ভিটএক্স[®]-ডব্লিউএস ^{প্লাস} পাউডার

Balanced Nutritional for Livestock



সরবরাহ: ১০০ গ্রাম

উপাদান:
মাল্টিভিটামিন ও প্রাকৃতিক বিটেইন

নির্দেশনা:
প্রয়োজনীয় ভিটামিন এর ঘাটতি দূর করে এবং
মাংস ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

প্রয়োগমাত্রা:
দৈনিক ১ গ্রাম/ ৫-১০ লি পানিতে

VitaX[®]-C Powder

ভিটএক্স[®]-সি পাউডার

ধকল প্রতিরোধ ও ক্ষত নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকর



সরবরাহ:
১০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম

উপাদান:
ভিটামিন সি ১০০% (এসকরবিক এসিড)

নির্দেশনা:
ভিটামিন সি এর অভাব পূরণ করে; বিভিন্ন
ধরনের পীড়ন/ধকল নিয়ন্ত্রণ করে; রোগ প্রতিরোধ
ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং এন্টি-অক্সিডেন্টের কাজ
করে।

প্রয়োগমাত্রা:
১ গ্রাম/ ৫-১০ লি. পানিতে ৩-৫ দিন অথবা
১০০-৩০০ গ্রাম/ টন খাদ্যের সাথে ৩-৫ দিন।

E Cal-P[®] Powder

ই ক্যাল-পি[®] পাউডার

মজবুত হাড় গঠনের জন্য আদর্শ সাপ্লিমেন্ট



সরবরাহ: ৫০০ গ্রাম

উপাদান:
ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন বি_{১২},
ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি_৩ এবং সাইট্রিক
এসিড

নির্দেশনা:
ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও প্রয়োজনীয়
ভিটামিনের অভাবজনিত রোগে ব্যবহার্য ও
হাড়ের গঠনে সহায়তা করে।

প্রয়োগমাত্রা:
চিকুস: ১ গ্রাম/ লি. পানিতে, ব্রয়লার: ১-২ গ্রাম/ লি.
পানিতে, লেয়ার: ২-৪ গ্রাম/ লি. পানিতে
গবাদিপ্রাণি: দৈনিক ১৫-৩০ গ্রাম খাদ্যে
মাছ ও চিংড়ি: দৈনিক ১-২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি খাদ্যে



সরবরাহ: ৫০০ মিলি, ১ লি. ও ৫ লি.

OraZinc® Solution

Miracle power

ওরাজিংক® সলিউশন

এনজাইম সিস্টেমকে কার্যকর করার মাধ্যমে রুচিবোধ বাড়ায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে

উপাদান:

প্রতি ৫ মিলিতে আছে-
জিংক - ১০ মিগ্রা
(জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট হিসেবে)

নির্দেশনা:

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; দৈহিক ওজন বৃদ্ধি করে এবং ডায়রিয়া ও রক্ত আমাশয় রোধ করে; পাখনা ও পালকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগমাত্রা:

৩০-৪০ মিগ্রা/ কেজি দৈহিক ওজন হিসাবে
প্রতিরোধে: ২ মিলি/ লি. পানিতে
চিকিৎসায়: ৩ মিলি/ লি. পানিতে



সরবরাহ: ৫০০ মিলি, ১ লি.

Livaton® liquid

রুচি বৃদ্ধিকারক খাদ্য হজমে সহায়ক

লিভাটন® লিকুইড

উপাদান:

হার্বাল লিভার টনিক

নির্দেশনা:

লিভারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে; ফ্যাটি লিভার সিনড্রোম প্রতিকার করে; লিভার ফাইব্রোসিস প্রতিরোধ করে এবং টক্সিনের ক্ষতি থেকে লিভারকে রক্ষা করে।

প্রয়োগমাত্রা:

পোন্ধি: ১ মিলি/ লি. পানিতে
বাহুর: ছাগল ও ভেড়া: দৈনিক ১৫-৩০ মিলি। (প্রতি মাসে ৭-১০ দিন খাওয়াতে হবে)। গবাদিপশু: দৈনিক ৩০-৬০ মিলি (প্রতি মাসে ৭-১০ দিন খাওয়াতে হবে)।



সরবরাহ: ২.৫ কেজি

EON Broiler/Layer/Grower

Premix

ইয়ন ব্রয়লার/লেয়ার/গ্রোয়ার

প্রিমিক্স

উপাদান:

ভিটামিন, মিনারেল ও এমাইনো এসিডের সংমিশ্রণ

নির্দেশনা:

ওজন বৃদ্ধি করে; অসুস্থতা ও মৃত্যুহার হ্রাস করে ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

প্রয়োগমাত্রা:

২.৫ কেজি/ টন



সরবরাহ: ১০০ মিলি

VitaX-AD3E® Solution

Balanced formula for healthy life

ভিটাক্স-এডি৩ই সলিউশন

উপাদান: প্রতি মিলিতে আছে-
ভিটামিন এ - ১,০০,০০০ আই.ইউ,
ভিটামিন ডি_৩ - ২০,০০০ আই.ইউ,
ভিটামিন ই - ২০ মিগ্রা

নির্দেশনা: ভিটামিন এডি_৩ই এর অভাবজনিত লক্ষণ প্রতিরোধ করে; রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ও প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; দৈহিক ওজন; ডিম ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিতে; যেকোন ধরনের ধকল প্রতিরোধে; ব্যাকটেরিয়া ও কৃমি সংক্রমণজনিত ধকল পুনরুদ্ধারে; দুর্বলতা, অবসাদ, ক্ষুধামন্দা, রিকটস ও বিপাকীয় সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রয়োগমাত্রা:

পোন্ধি: ১ মিলি/ ৩-৪ লিটার খাবার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন।
গরু ও ঘোড়া: ৫-১০ মিলি প্রতিটি প্রাণির জন্য ২-৩ দিন।
বাহুর ও অশুশাবক: ৫ মিলি প্রতিটি প্রাণির জন্য ২-৩ দিন।
ছাগল ও ভেড়া: ২-৩ মিলি প্রতিটি প্রাণির জন্য ২-৩ দিন।

গ্রোথ প্রমোটার



সরবরাহ: ১০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম

Broiler Boost® Powder

বেশি ওজন, বেশি লাভ

ব্রয়লার বুস্ট® পাউডার

উপাদান:

ক্রুড ফ্যাট - ৩.৫%, ক্রুড প্রোটিন - ০.৫%, কার্বোহাইড্রেট - ৪.৫%, ভিটামিন এ - ৫০,০০,০০০ আই.ইউ., ভিটামিন সি - ১০%, ভিটামিন ডি_৩ - ৫,০০,০০০ আই.ইউ., ভিটামিন ই - ৩%, ডেক্সট্রোজ ও এন্টি-কেকিং এজেন্ট

নির্দেশনা:

হজমশক্তি বৃদ্ধি করে; দৈহিক ওজন বৃদ্ধি করে; ফ্যাট স্থানান্তরসহ প্রোটিন ও অ্যামাইনো এসিডের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে।

প্রয়োগমাত্রা:

১ গ্রাম/ ৩ লি. পানিতে মিশিয়ে প্রতি সপ্তাহে পরপর ৫ দিন খাওয়াতে হবে (সকালে অথবা রাতে)।



সরবরাহ: ১ লিটার

AviCare™ Solution

Strong Immunity, High Profitability

এভিক্যার™ সলিউশন

উপাদান:

ঈষ্ট (স্যাকারোমাইসিস সেরিভেসি), কালচার মিডিয়া, শস্যদানা, মোলাসেস

নির্দেশনা:

পরিপাকতন্ত্রের সকল প্রকার রোগ প্রতিরোধে (সালমোনেলোসিস, কলিব্যাসিলোসিস, নেক্রোটিক এন্টারাইটিস ইত্যাদি) এবং ইমিউনো সাপ্রেসিভ রোগ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়, পোন্ধির মৃত্যুর হার ও রোগের প্রকোপ কমায়।

প্রয়োগমাত্রা:

১ মিলি/ ১ লি. পানিতে মিশিয়ে প্রতি সপ্তাহে ৩-৪ দিন খাওয়াতে হবে।

এন্টিবায়োটিক/ কন্ট্রিডায়োস্ট্যাট/ এন্টিমাইকোপ্লাজমা



সরবরাহ: ১০০ গ্রাম

EST-Vet® Powder

ইএসটি-ভেট® পাউডার

মাইকোপ্লাজমা এবং সকল গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াকে সমূলে ধ্বংস করে

উপাদান:

ইরাইথ্রোমাইসিন থায়োসায়ানাইট
আইএনএন ১৮%, সালফাডায়াজিন ১৫%
ও ট্রাইমেথোপ্রিম ৩%

নির্দেশনা:

বিভিন্ন গ্রাম পজেটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ
ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমা দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন
সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে ব্যবহার্য।

প্রয়োগমাত্রা:

পোল্ট্রি: ০.৫-১ গ্রাম/ লি. পানির সাথে ৩-৫ দিন
বাহুর: ১.৫/ ৫০ কেজি দৈনিক ওজন হিসাবে ৩-৫ দিন
মাছ: ১ গ্রাম/ ১০ কেজি দৈনিক ওজন হিসাবে



সরবরাহ: ১০০ মিলি

Flumequine® Solution

ফ্লুমিকুইন® সলিউশন

উপাদান:

ফ্লুমিকুইন ২০%

নির্দেশনা:

ফ্লুমিকুইন এর প্রতি সংবেদনশীল অণুজীব বিশেষ করে গ্রাম
নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট পরিপাকতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, রেচনতন্ত্র ও
প্রজননতন্ত্রের রোগসমূহ যথা-সালমোনেলোসিস, কলিবেসিলোসিস,
প্যাশুরেলোসিস ইত্যাদি রোগের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর।

প্রয়োগমাত্রা:

প্রতিরোধ: ১ মিলি/৪ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন।
নিরাময়ে: ১ মিলি/২ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩-৫ দিন।



সরবরাহ:
১০০ গ্রাম, ১ কেজি

Eon-CTC® Powder

ইয়ন-সিটিসি® পাউডার

The Broad Spectrum Antibiotic

উপাদান:

ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন ২০%

নির্দেশনা:

গ্রাম পজেটিভ ও নেগেটিভ
ব্যাকটেরিয়াল আক্রমণ
প্রতিরোধ করে।

প্রয়োগমাত্রা:

চিকিৎসায়: ৫০ গ্রাম/ ৭৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫-৭ দিন অথবা ৭৫-১০০ গ্রাম/ ১০০ কেজি
খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ৫-৭ দিন
প্রতিরোধ: ৪০ গ্রাম/ ১০০ কেজি খাদ্যের সাথে মিশিয়ে নিয়মিত খাওয়াতে হবে।
মাইকোপ্লাজমোসিস এর জন্য: ১১০-৩০০ মিগ্রা/ কেজি দৈনিক ওজন হিসেবে অথবা ১-৩ গ্রাম/
কেজি পানির সাথে মিশিয়ে ৫-৭ দিন



সরবরাহ: ১০০ গ্রাম

ClinVet® Powder

ক্লিনভেট® পাউডার

Reliable treatment for enteric infection

উপাদান:

প্রতি গ্রাম পাউডার এ
আছে- নিওমাইসিন
সালফেট বিপি ৭০০
মিগ্রা

নির্দেশনা:

ক্লিনভেট একটি ব্রড স্পেকট্রাম অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড এন্টিবায়োটিক যা
গ্রাম পজেটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সক্রিয়।
পোল্ট্রির ব্যাকটেরিয়া যেমন: ই.কলাই, সালমোনেলা, স্ট্রেপটোকক্কাস,
স্টেফাইলোকক্কাস, কেম্পাইলোব্যাক্টার ও লিস্টেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট আন্ত্রিক
প্রদাহের প্রতিরোধ এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। একদিনের বাচা
মুরগির ঠাণ্ডা জনিত রোগ ও নাভি প্রদাহ নির্মূল করে মৃত্যুহার কমায়।

প্রয়োগমাত্রা:

পোল্ট্রি: ১ গ্রাম / ৬-৭ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে
৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।



সরবরাহ: ১০০ মিলি

Florfen® Vet Solution

ফ্লোরফেন® সলিউশন

Outstanding results to treat
•Respiratory Disease •Intestinal Disease

উপাদান:

ফ্লোরফেনিকল
২০%

নির্দেশনা:

ফ্লোরফেন ভেট ওরাল সলিউশন পোল্ট্রির অস্বাভাবিক ও শ্বাসতন্ত্রের
বিভিন্ন রোগ যেমন: নিউমোনিয়া, সালমোনেলোসিস, ফাউল
কলেরা, ফাউল টাইফয়েড, কলিব্যাসিলোসিস, পুলোরাম ডিজিজ ও
স্ট্রেপটোকক্কোসিস প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর।

প্রয়োগমাত্রা:

পোল্ট্রি: ১ মিলি / ২ লি. খাবার পানিতে মিশিয়ে, অথবা
২০-৩০ মিগ্রা / কেজি দৈনিক ওজন হিসেবে ৩-৫ দিন
খাওয়াতে হবে।



সরবরাহ: ১০০ গ্রাম

Mycoloc[®] Vet Solution

মাইকোলক[®] ভেট সলিউশন

3rd Generation Antibiotic to Treat Respiratory & Enteric Bacterial Infections

উপাদান:
টিলমিকোসিন
ফসফেট ইউএসপি
২৫০ মিগ্রা

নির্দেশনা:
মাইকোলক ভেট পোস্ত্রিতে মাইকোপ্লাজমা পিপিসিস দ্বারা সৃষ্ট সিনারডি, সিসিআরডি, আর্থ্রাইটিস ও ক্রোসট্রিডিয়াম পারফ্রিনজেন্স দ্বারা সৃষ্ট নেক্রোটিক এন্টারাইটিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও টিলমিকোসিন এর প্রতি সংবেদনশীল মাইক্রোঅরগ্যানিজম যেমন- মাইকোপ্লাজমা পিপিসিস, অ্যাক্টিনোব্যাসিলাস পুরোনিউমোনিয়া, প্যাস্কুরেলা মাল্টিসিডা, ম্যানহিমিয়া হিমোলাইটিকা ও অ্যাক্টিনোমাইসেস পাইয়োজিনেস দ্বারা সৃষ্ট গবাদিপ্রাণির শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগমাত্রা:

পোস্ত্রি: ১ মিলি / ৩ লিটার খাবার পানিতে অথবা ১৫-২০ মিগ্রা প্রতি কেজি দৈনিক ওজন হিসেবে ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

বাছুর: ১ মিলি প্রতি ২০ কেজি দৈনিক ওজন হিসেবে অথবা ১২.৫ মিগ্রা প্রতি কেজি দৈনিক ওজন হিসেবে দিনে ২ বার ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।



সরবরাহ:
১০০ মিলি, ৫০০ মিলি

CiproVet[®] Solution

সিপ্রোভেট[®] সলিউশন

Strong & Broad Spectrum Antibiotic

উপাদান:
সিপ্রোফ্লক্সাসিন হাইড্রোক্লোরাইড
ইউএসপি ১০%

নির্দেশনা:
পোস্ত্রির ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমা জনিত রোগসমূহ বিশেষ করে সিনারডি প্রতিরোধ ও নিরাময়ে ব্যবহৃত।

প্রয়োগমাত্রা:

প্রতিরোধে: ১ মিলি/ ৪-৮ লি. পানিতে পরপর ৩ দিন
নিরাময়ে: ১ মিলি/ ১-২ লি. পানিতে পরপর ৩-৫ দিন



সরবরাহ:
১০০ মিলি, ৫০০ মিলি

Cox-Zero[®] Solution

কক্স-জিরো[®] সলিউশন

An Ideal Management for Coccidiosis in Poultry

উপাদান:
টন্ড্রাজুরিল ২.৫%

নির্দেশনা:
পোস্ত্রির যে কোন ধরনের কক্সিডিয়োসিস বা রক্ত আমাশয়ে অত্যন্ত কার্যকর এবং পোস্ত্রিতে কক্সিডিয়োসিস রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন আইমেরিয়া প্রজাতির বিরুদ্ধে কার্যকর।

প্রয়োগমাত্রা:

পোস্ত্রি: ১ মিলি/ লি. পানিতে পরপর ২ দিন।
মারাত্মক সংক্রমণের ক্ষেত্রে ৫ দিন পর পুনরায় চিকিৎসায় দেওয়া যেতে পারে।



সরবরাহ: ১০০ গ্রাম

G-Vet[®] Powder

Powerful Therapeutic Solution Against Infection

জি-ভেট[®] পাউডার

উপাদান: প্রতি গ্রাম
পাউডার এ আছে
জেন্টামাইসিন - সালফেট
বিপি ৩৩৮.৯৮ মিগ্রা
(২০০ মিগ্রা জেন্টামাইসিন
এর সমতুল্য)

নির্দেশনা:
জেন্টামাইসিন সালফেট হচ্ছে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড গ্রুপের অর্ন্তভুক্ত ব্যাকটেরিসাইডাল এন্টিবায়োটিক যা বিভিন্ন গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যথা- কলিব্যাসিলোসিস, সালমোনেলোসিস, প্যাস্কুরেলোসিস, এন্টারাইটিস সহ ইয়ক স্যাক ও ফাউল কলেরা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও কম বয়সী বাচ্চার মৃত্যুর প্রতিরোধ সহ শ্বাসতন্ত্র, মূত্রনালী ও পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগমাত্রা:

পোস্ত্রি: ১ গ্রাম/ ২-৪ লিটার খাবার পানিতে অথবা ৫-১০ মিগ্রা, প্রতি কেজি দৈনিক ওজন হিসাবে পরপর ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।
গবাদিপ্রাণি: ০.১৫ গ্রাম প্রতি কেজি দৈনিক ওজন হিসাবে দৈনিক ২ বার পরপর ৩-৫ দিন খাওয়াতে হবে।

ইলেক্ট্রোলাইট/স্যালাইন



সরবরাহ: ১ কেজি

OsmoSaline[®] Powder

অসমোস্যালাইন[®] পাউডার

ডায়রিয়া ও ধকল প্রতিরোধী

উপাদান: প্রতি ২৫ গ্রাম পাউডারে আছে-
সোডিয়াম বাইকার্বোনেট - ১২.৫ গ্রাম, সোডিয়াম
ক্লোরাইড - ৬.৬৫ গ্রাম, পটাশিয়াম ক্লোরাইড - ১.২৫
গ্রাম, ভিটামিন এ - ৩৭,৫০০ আই.ইউ, ডেক্সট্রোজ
এনহাইড্রাস - ৩.২৫ গ্রাম ও প্রাকৃতিক বিটেইন

নির্দেশনা:

শরীরে জলীয় অংশ ও ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য রক্ষা করে; ডায়রিয়া জনিত ইলেক্ট্রোলাইটের অভাব পূরণ করে।

প্রয়োগমাত্রা:

পোস্ত্রি: ১.২৫ গ্রাম/ লি. পানিতে।

টক্সিন বাইন্ডার



সরবরাহ: ২৫ কেজি

KeytoxTM

Mycotoxin binder, adsorbent and anti-caking agent

উপাদান:

বেনটোনাইট, মন্টমরিলিনাইট, ক্লিনপটিলোলাটি, সেপিওলাইট

নির্দেশনা:

মাইকোটক্সিন বাইন্ডার ও আফ্লাটক্সিনের জন্য অধিক কার্যকর।

প্রয়োগমাত্রা:

১-৩ কেজি/ টন খাদ্যে ক্রমাগত খাওয়াতে হবে।

কিটক্সTM

কিডনি টনিক



সরবরাহ: ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি

NephroSafe[®] Solution

Healthy kidney Healthy Life

নেফ্রোসেফ[®] সলিউশন

উপাদান:

বোরহেডিয়া ডিফিউসা, ট্রাইবুলাস টেরেসট্রিস, টিনোস্পোরা করডিফোলিয়া, ইকলিপ্টা প্রেসট্রেট, ক্রাটেভা নারভালা; রুবিয়া করডিফোলিয়া টার্মিনালিয়া চেবুলা, কোলচিকাম লুটেয়াম, এলিয়াম স্যাটিভাম, ভিটামিন এ, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড

নির্দেশনা:

কিডনির স্বাভাবিক ও অনুকূল কার্যকারিতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

প্রয়োগমাত্রা: দৈনিক ১০০ টির জন্য

মুরগীর বাচ্চা: ৫ মিলি, প্রোয়ার: ১০ মিলি, লেয়ার ও ব্রিডার: ২০ মিলি অথবা

প্রতিরোধে: ১ মিলি ১ লি. পানিতে
নিরাময়ে: ২ মিলি ১ লি. পানিতে

ফিড এডিটিভ্‌স



সরবরাহ: ২৫ কেজি, ৫০ কেজি

TopCare

all-in-1-solution

টপ কেয়ার

উপাদান:

লেয়ার ও ব্রয়লার খাদ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানগুলোর সমন্বয়ে গঠিত উন্নত মানের সুখম কনসেনট্রেট

নির্দেশনা:

ক্ষুদ্র উপাদানগুলোর মান ও সুখম মিশ্রণ নিশ্চিত করে: ডিম ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগমাত্রা:

লেয়ার, ব্রয়লার ও সোনালী: ৫০ কেজি / টন খাবারে।



সরবরাহ: ২৫ কেজি

VictoSal[®]

সালমোনেলা ইনহিবিটর (প্রতিরোধক)

ভিক্টোসাল

উপাদান:

ক্যালসিয়াম ফরমেট এবং ক্যালসিয়াম প্রপিয়নেট

নির্দেশনা:

পানি ও খাবারের সাথে আগত বিভিন্ন প্রকারের ব্যাকটেরিয়া (যেমন: সালমোনেলা) এবং ছত্রাক (যেমন: এসপারজিলাস) প্রতিরোধ করে।

প্রয়োগমাত্রা:

১ - ৩ কেজি / টন খাদ্যে

পোল্ট্রি ভ্যাকসিন সমূহ

Prevention is Better than Cure



সরবরাহ: ১০০০ ডোজ

অরনিমিক্স ক্লোন

ORNIMIX CLONE (ND+IB Vaccine)

রাণীক্ষেত ও ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস রোগের বিরুদ্ধে সমন্বিত ফ্রিজ ড্রাইড লাইভ পোল্ট্রি ভ্যাকসিন

উপাদান:

প্রতি মাত্রা ভ্যাকসিন এ কার্যকরী উপাদান হিসাবে ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস ভাইরাস এইচ ১২০ স্ট্রেন (১০^৩ আইডি_{৫০} - ১০^{৪.৮} আইডি_{৫০}) এবং নিউক্যাসেল ডিজিজ ভাইরাসের স্ট্রেন (১০^৬ আইডি_{৫০} - ১০^{৭.৫} আইডি_{৫০}) রয়েছে

নির্দেশনা:

মোরগ-মুরগির রানীক্ষেত ও ইনফেকশাস ব্রংকাইটিস রোগের শক্তিশালী জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার্য।

প্রয়োগমাত্রা:

প্রস্তুতকৃত ভ্যাকসিন প্রতিটি মুরগির চোখ / নাক এ এক ফোঁটা করে অথবা খাবার পানির সাথে / স্প্রে এর মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
প্রাথমিক ডোজ: ৩-৫ দিন বয়সে
বুস্টার ডোজ: ৩-৪ সপ্তাহ পর পর



সরবরাহ: ৫০০ ডোজ ও
১০০০ ডোজ

অরনিপেস্ট

ORNIPEST (ND Lasota Vaccine)

রাণীক্ষেত রোগের বিরুদ্ধে ফ্রিজ ড্রাইড লাইভ পোল্ট্রি ভ্যাকসিন

উপাদান:

প্রতি মাত্রা ভ্যাকসিন এ কার্যকরী উপাদান হিসাবে নিউ ক্যাসেল ডিজিজ ভাইরাসের লাসোটা স্ট্রেন (SL 93) (১০^{৬.০} আইডি_{৫০} - ১০^৮ আইডি_{৫০}) রয়েছে

নির্দেশনা:

মোরগ-মুরগির রানীক্ষেত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার্য।

প্রয়োগমাত্রা:

প্রস্তুতকৃত ভ্যাকসিন প্রতিটি মুরগির চোখ / নাক এ এক ফোঁটা করে অথবা খাবার পানির সাথে / স্প্রে এর মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
প্রাথমিক ডোজ: ১৪ দিন বয়সের পর
বুস্টার ডোজ: ৬-৮ সপ্তাহ পর পর



সরবরাহ: ৫০০ ডোজ ও
১০০০ ডোজ

অরনিবার ইন্টারমেডিয়েট

ORNIBUR INTERMEDIATE (IBD Live Vaccine)

গামবোরো রোগের বিরুদ্ধে ফ্রিজ ড্রাইড লাইভ পোল্ট্রি ভ্যাকসিন

উপাদান:

প্রতি মাত্রা ভ্যাকসিন এ কার্যকরী উপাদান হিসাবে ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ ভাইরাস, স্ট্রেন: IBDV OP-23 (১০^৪ টিসি আইডি_{৫০} - ১০^{৭.৩} টিসি আইডি_{৫০}) রয়েছে

নির্দেশনা:

মোরগ-মুরগির গামবোরো রোগের শক্তিশালী জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার্য।

প্রয়োগমাত্রা:

প্রস্তুতকৃত ভ্যাকসিন প্রতিটি মুরগির চোখ / নাক এ এক ফোঁটা করে অথবা খাবার পানির সাথে / স্প্রে এর মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
প্রাথমিক ডোজ: ৭-১০ দিন বয়সে
বুস্টার ডোজ: প্রাথমিক ডোজ এর ১ সপ্তাহ পর



সরবরাহ: ৫০০ ডোজ ও
১০০০ ডোজ

অরনিবার ইন্টারমেডিয়েট প্লাস

ORNIBUR INTERMEDIATE PLUS (IBD Live Vaccine)

গামবোরো রোগের বিরুদ্ধে ফ্রিজ ড্রাইড লাইভ পোল্ট্রি ভ্যাকসিন

উপাদান:

প্রতি মাত্রা ভ্যাকসিন এ কার্যকরী উপাদান হিসাবে ইনফেকশাস বারসাল ডিজিজ ভাইরাস, স্ট্রেন: IBDV OP-1 (১০^৪ টিসি আইডি_{৫০} - ১০^{৭.২} টিসি আইডি_{৫০}) রয়েছে

নির্দেশনা:

মোরগ-মুরগির গামবোরো রোগের শক্তিশালী জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার্য।

প্রয়োগমাত্রা:

প্রস্তুতকৃত ভ্যাকসিন প্রতিটি মুরগির চোখ / নাক এ এক ফোঁটা করে অথবা খাবার পানির সাথে / স্প্রে এর মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
প্রাথমিক ডোজ: ৭-১০ দিন বয়সে
বুস্টার ডোজ: প্রাথমিক ডোজ এর ১ সপ্তাহ পর

Further information is available from
EON ANIMAL HEALTH PRODUCTS LTD.

304 Tejgaon I/A; Dhaka-1208, Bangladesh

Tel: +880-2-9830915-18 | Fax: +880-2-9830919-20 | www.eongroup.net.bd